Categorie di classificazione (sistema gerarchico)

Dominio

Regno

Divisione = Phylum

Classe

Ordine

Famiglia

Genere

Specie

Albero filogenetico universale basato sulla comparazione delle sequenze dell'RNA ribosomale 16S

Progenitore universale

Fig. 2. Oggi il mondo vivente viene suddiviso in 5 Regni: Monere, Protisti, Funghi, Piante e Animali. È probabile tuttavia, Regno Monere e il Regno Protisti debbano subire ulteriori divisioni.

Tabella 21.1. Scala geocronologica.

Le sequenze geologiche vengono indicate tradizionalmente con la più giovane o più recente in alto, essendo questo il modo in cui si sono depositati gli strati delle rocce sedimentarie.

ERA	Periodo	Epoca	Durata in milioni di anni (appross.)	Milioni di anni fa (appross.)	Principali pietre miliari biologiche
CENOZOICO	Quaternario	Olocene	Circa ultimi	5000 a	civilizzazione
		Pleistocene	2,5	2,5	glaciazione, nascita dell'uomo
		Pliocene	4,5	7	
	Terziario	Miocene	19	26	diversificazione dei mammiferi e delle angiosperme
		Oligocene	12	38	
		Eocene	16	54	
		Paleocene	11	65	
	Cretaceo	71	136	nascita delle angiosperme, estinzione definitiva dei dinosauri	
	MESOZOICO	Giurassico	54	190	foreste di gimnosperme cosmopolite; apogeo dei dinosauri; primi uccelli
		Triassico	35	225	diffusione delle foreste di gimnosperme e dei dinosauri; primi mammiferi
Permiano		55	280	nascita delle conifere e dei rettili; estinzione degli alberi delle foreste paludose	
Carbonifero		65	345	foreste paludose; primi rettili e insetti; prime spermatofite (piante a seme)	
Devoniano		50	395	piante terrestri primitive e anfibi	
PALEOZOICO	Siluriano	35	430	prime piante terrestri	
	Ordoviciano	70	500	primi pesci; invertebrati abbondanti e diversi	
	Cambriano	70	570	alghe macroscopiche (alghe marine); invertebrati a guscio duro	
	Ediacariano	≈130	700	primi invertebrati a molle	
	(Proterozoico)		1.5 MIL. EUC.	ORG. PLURICELLULARI: procarioti, piante, animali unicellulari	
	(Archeano)		3.5 MILIARDI ANTERA	prima vita unicellulare; si sviluppa il «brodo primordiale» prebiotico	
PRECAMBRIANO			4.500	origine della Terra	

1,5 miliardi EUCARIOTI

4,5 miliardi di anni = 24 h

- La vita è comparsa abbastanza presto
- Ci è voluto parecchio per gli organismi pluricellulari
- L'uomo è comparso circa 30 secondi prima della mezzanotte!

Procarioti

- (a) *Clostridium botulinum* (agente del botulismo); altri bacilli: *Erwinia* (colpo di fuoco del pero e del melo), *Pseudomonas* (avvizzimento delle banane, pomodori e patate)
- (b) *Micrococcus luteus*; altri cocchi: *Streptococcus lactis* (inacidimento del latte)
- (c) *Magnetospirillum magnetotacticum*

Nutrizione e metabolismo dei batteri

AUTOTROFI

Fotoautotrofi: fabbricano le sostanze organiche utilizzando l'energia solare

Chemioautotrofi: fabbricano le sostanze organiche utilizzando l'energia che ricavano dall'ossidazione di composti inorganici (Es: Acido solfidrico, metano)

ETEROTROFI

Saprofiti: decompongono residui vegetali ed animali con esoenzimi ed assorbono gli elementi così solubilizzati

Parassiti: ricavano gli elementi nutritivi invadendo il corpo di altri organismi (spesso sono patogeni)

Simbionti: vivono associati ad altri organismi in una situazione di reciproco vantaggio

Esempi di batteri chemioautotrofi:

Batteri del suolo che vivono spesso in associazione con i batteri decompositori (l' NH_3 proviene dalla decomposizione di residui organici)

Principali batteri fotoautotrofi:

(1) Solfobatteri verdi e porpurei:

- sono strettamente anaerobi, la presenza di O₂ inibisce la fotofosforilazione;
- formano colonie nelle acque stagnanti;
- contengono diverse bacterioclorofille;
- contengono carotenoidi diversi da quelli delle piante superiori
- l'apparato fotosintetico è formato da vescicole somiglianti a tilacoidi
- hanno un solo fotosistema: quello dei verdi sembra essere il precursore del fotosistema I e quello dei porpurei il precursore del fotosistema II

- utilizzano come donatori di elettroni composti solforati:

(2) Batteri **porpurei non solfurei**:

- Si trovano negli acquitrini come i solfobatteri
- Sono anaerobi facoltativi
- Sono sia autotrofi che eterotrofi
- utilizzano come donatori di elettroni composti organici quali alcoli, acidi grassi, chetoacidi):

Hp: i progenitori di questi batteri sono diventati endosimbionti di cellule “eucariote” e si sono evoluti come mitocondri

Halobacterium halobium (alofili estremi => *Archaea*): sintesi di ATP mediata dalla luce e dalla bacteriorodopsina (meccanismo che non coinvolge la clorofilla):

(3) Proclorofita:

Si conoscono 3 diversi generi:

1. *Prochloron* => vive in simbiosi con le ascidie lungo i litorali tropicali;
2. *Prochlorotrix* => in Olanda nei fondali bassi di alcuni laghi
3. *Prochlorococcus* => fondali oceanici

Contengono clorofille a e b e carotenoidi, gli stessi pigmenti delle alghe verdi e delle piante terrestri

Hp: questi batteri potrebbero aver dato origine ai cloroplasti delle alghe verdi e delle piante terrestri

Ma: la sequenza dell'RNA ribosomale è più simile a quella dei cianobatteri che a quella dei cloroplasti delle alghe verdi e delle piante terrestri e sembra che le proclorofite siano un gruppo polifiletico derivato dai cianobatteri

→ È più verosimile che qualche batterio simile ai cianobatteri possa essere all'origine dei cloroplasti delle alghe verdi

(4) Cianobatteri:

Caratteristiche citofisiologiche

- Organismi unicellulari singoli o riuniti in colonie coccoidi (A-E) o filamentose (F-H)
- Non hanno flagelli

Oscillatoria

Nostoc

Synechococcus

Synechocystis

Microcystis

Gleocapsa

Stigonema

eterocisti

Nostoc

Oscillatoria

Lyngbya

- Cellula procariotica
- Pigmenti: chl a, ficobiline carotenoidi (fotosistemi I e II)
- Presenza di tilacoidi

Anabena

Nostoc (cells in divisione tenute insieme dalla guaina mucillaginosa)

Ecologia:

- 7500 specie presenti in tutti gli ambienti anche in quelli estremi (ghiacciai, deserti, termali etc.)
- “liberi” (solo 200 specie) o in simbiosi con spugne, amebe, diatomee, alghe verdi, briofite, piante vascolari

•Concorrono alla formazione delle rocce sedimentarie (la guaina mucillaginosa che le avvolge intrappola CaCO_3)

•In carenza di ossigeno => fioriture (Es. Mar Rosso)

•Importanti nel “ciclo dell’Azoto”:

Filamento di *Anabaena*

Nitrogenasi: sensibile all’O₂ →

- Parete ispessita da glicolipidi
- Assenza fotosistema II
- Connessione alle cellule adiacenti tramite “plasmodesmi”

Specie che fissano N₂ conducono vita libera o sono simbiotici

EX:
Trichodesmium vive libero negli oceani in zone tropicali

Anabaena azollae

Risaie fertilizzate da *Anabaena azollae*

Esempi di batteri simbiotici:

FIGURE 12.3. Root nodules on soybean (a) and alder tree (b). The nodules in soybean are a result of infection by *Rhizobium japonicum*; those in alder (*Alnus*) are caused by *Frankia*, a bacterium that belongs to the actinomycetes. The associations between actinomycetes and their hosts are called actinorrhizal associations. All known actinorrhizal associations occur in shrubs or trees. (Part (a) from The Nitrogen Company; (b) from H. J. ...)